

「スクミリンゴガイ」に登録がある薬剤

作物名	商品名	IRAC	使用量	使用時期	使用回数	使用方法	有機JAS 使用可否
稲	スクミ斬V	未	2～4kg/10a	発生時	-	散布	○
	スクミブルー	未	2～8kg/10a	発生時	-	散布	○
					-	無人航空機による散布	
	スクミベイトV	未	2～4kg/10a	発生時	-	散布	○
	ジャンボたにしくん*	未	1～2kg/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	×
	ジャンボタニシ退治剤*	未	2～4kg/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布又は無人航空機による散布	×
	スクミノン*	未	1～4kg/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布又は無人航空機による散布	×
			4kg/10a	収穫30日前まで	6回以内	散布	×
稲 (箱育苗)	パダン粒剤4	14	育苗箱1箱当り 60～100g	は種前又は移植当日	1回	は種前に育苗箱床土に均一に混和するか、 又は 移植当日に育苗箱中の苗の上から均一に散粒する。	×

○農薬使用の際は、ラベル表示（使用基準）を必ず確認してから使用しましょう。

○令和8年5月8日現在の登録内容で作成しています。

○農薬の飛散防止に努めましょう。

○農薬の使用記録簿をつけるよう努めましょう。

*の付いた薬剤の有効成分は「メタアルデヒド」で、同成分の使用回数は2回以内です。超過しないよう注意しましょう。

お問い合わせ先：加須農林振興センター農業支援部(TEL：0480-61-3911)